

## 13. Übungsblatt „Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie“

Abgabe bis Dienstag 23.1., 15 Uhr

### Aufgabe 1 (Gesetz der großen Zahlen via charakteristische Funktionen).

- a) Beweisen Sie mithilfe von charakteristischen Funktionen die folgende Version des schwachen Gesetzes der großen Zahlen :
- Sind  $X_1, X_2, \dots : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  i.i.d. Zufallsvariablen in  $\mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$  mit  $E[X_i] = m$ , dann konvergiert die Verteilung von  $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$  schwach gegen das Diracmaß  $\delta_m$ .
- b) Folgern Sie hieraus, dass  $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$  auch stochastisch gegen  $m$  konvergiert.

### Aufgabe 2 (Grenzwertsatz für Poisson-Verteilungen).

- a) Bestimmen Sie (z.B. mithilfe von charakteristischen Funktionen) die Verteilung der Summe von  $n$  unabhängigen Poisson-verteilten Zufallsvariablen mit Parameter  $\lambda > 0$ .
- b) Zeigen Sie mithilfe des zentralen Grenzwertsatzes:

$$e^{-n} \left( 1 + \frac{n}{1!} + \frac{n^2}{2!} + \dots + \frac{n^n}{n!} \right) \rightarrow \frac{1}{2} \quad \text{für } n \rightarrow \infty.$$

### Aufgabe 3 (Fehlerfortpflanzung bei transformierten Beobachtungen).

Sei  $(X_i)_{i \in \mathbb{N}}$  eine Folge von unabhängigen, identisch verteilten reellwertigen Zufallsvariablen mit endlicher Varianz  $v > 0$  und Erwartungswert  $m$ . Sei  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  zweimal stetig differenzierbar mit  $f'(m) \neq 0$  und beschränktem  $f''$ . Zeigen Sie: Für  $n \rightarrow \infty$  gilt

$$\frac{\sqrt{n/v}}{f'(m)} \left( f \left( \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \right) - f(m) \right) \xrightarrow{\mathcal{D}} N(0, 1).$$

(Hinweis: Verwenden Sie die Taylor-Entwicklung von  $f$  im Punkt  $m$  und schätzen Sie das Restglied mit der Tschebyscheff-Ungleichung ab.)

**Aufgabe 4 (Charakteristische Funktionen III).** Beweisen Sie folgende Aussagen:

a) Ist die charakteristische Funktion  $\phi$  einer Zufallsvariable  $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  reellwertig, so haben  $X$  und  $-X$  dieselbe Verteilung.

b) Für eine standardnormalverteilte Zufallsvariable  $Z$  gilt

$$\mathbb{E} [Z^{2n}] = \frac{(2n)!}{2^n n!} \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

c) Sind  $X_1, X_2, \dots$  unabhängige Zufallsvariablen mit charakteristischer Funktion  $\exp(-|t|^\alpha)$ ,  $\alpha > 0$ , so besitzt  $n^{-1/\alpha} \sum_{i=1}^n X_i$  dieselbe Verteilung wie  $X_1$ .